



Cynllun Gweithredu Rhywogaeth: Gorfanhadlen Lasgoch

Cyflwyniad

Maes

Dyma'r cynllun gweithredu rhywogaeth ar gyfer Gorfanhadlen Lasgoch, *Orobanch purpurea*. Bydd gwaith cadwraeth ar gyfer y rhywogaeth hon yn cynnwys gwella cyflwr ei chynefinoedd. Dylid ystyried y Cynlluniau Gweithredu Cynefinoedd perthnasol a restrir yn yr adran cynlluniau a pholisïau perthnasol isod wrth ar gyfer rheolaeth gyffredinol o'r cynefinoedd. Mae'r ddogfen hon yn adnabod gweithredoedd sy'n benodol ar gyfer Gorfanhadlen Lasgoch.

Ein Gweledigaeth

I gynnal a gwella niferoedd, maint, ac ystod y poblogaethau o Gorfanhadlen Lasgoch yn Sir Benfro.

Disgrifiad o'r Rhywogaeth

Disgrifiad ac anghenion cynefinol

Mae'r Gorfanhadlen Lasgoch yn rhywogaeth unflwydd neu ddyflwydd byr. Yn gyffredinol y mae'n barasit ar Filddail (*Achillea millefolium*), er bod cofnodion o blanhigion lletyol eraill, megis y Wermod Lwyd (*Artemisia absinthium*).

Mae gan y rhywogaeth goesyn glas sy'n tyfu hyd at 45cm o uchder, a blodau glasgoch. Mae'n cynhyrchu toreth o hadau (gan gael trafferth eu gwasgaru ar brydiau), ond gall ei bresenoldeb fod yn anghyson o flwyddyn i flwyddyn ar ambell i safle. Mae'n aelod o deulu Gorfanhadlen, sydd ar y cyfan yn ffafrio hafau cynnes. Cysylltir y rhywogaeth fel arfer gyda glaswelltir sych, heb ei darfu, ar briddoedd alcali, ac mae'r mwyafrif o gofnodion Prydeinig yn eu disgrifio ar hen bonciau/ymylon lonydd neu laswelltiroedd arfordirol/ar glogwyni.



Gwasgariad yn Sir Benfro

Cafodd ei ail-ganfod yn Ninbych-y-pysgod yn 2014, yn tyfu ar allt dywodlyd serth ar galchfaen Bryn y Felin. Gynt yr oedd i'w gael ar randiroedd nepell o'r bryn, ble mae cofnodion ohono rhwng 1906 a 1932.

Mae un cofnod arall ohono o'r cyfnod cyn 1970, yn Bosherton ar y llwybr rhwng y bont werdd a Broadhaven yn 1942.

Maint y boblogaeth

Mae ymddangosiadau Gorfanhadlen Lasgoch ym Maenorbŷr yn anghyson braidd (Ni chafodd ei weld yn 1998 nac 1999). Ar y prif safle (glaswelltir twyn sefydlog), mae'r nifer o goesynnau blodeuog a welwyd dros y 14 mlynedd ddiwethaf wedi amrywio o un (2000; 2002) i 40 clwstwr yn 1991, rhai gyda nifer o goesynnau, a 48 yn 1997. Ar yr ail safle (dan wal y fynwent) y cyfrifiad uchaf o'r un cyfnod oedd 6 (1991). Er chwilio manwl nid yw wedi'i weld ym Maenorbŷr ers 2005, pan gafwyd 7 o goesynnau blodeuog ar y prif safle.

Gwelwyd 6 pigyn blodeuog yn agos i'w gilydd yn Ninbych-y-pysgod yn 2014.

Tueddiadau

O ganlyniad i ailymddangosiad y rhywogaeth yn Ninbych-y-pysgod yn 2014, a'i ddiflaniad o Faenorbŷr yn 2005, mae'n anodd adnabod tueddiadau'r rhywogaeth yn Sir Benfro.

Statws Cadwriaethol

Ewrop: Nid yw dan fygythiad ar lefel Ewropeaidd.

DU: Wedi'i restru fel 'dan fygythiad' yn llyfrau Data Coch (planhigion fasnolaidd) Prydain a Lloegr. Cymru: Wedi ei restru fel 'mewn perygl difrifol' yn y rhestr Data Coch (planhigion fasnolaidd). Y poblogaethau ym Mhenfro yw'r unig rai sy'n bodoli yng Nghymru. Cafodd ffiniau Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbenig Freshwater East a Skrinkle Haven eu newid er mwyn cynnwys y safle ym Maenorbŷr. Mae Gorfanhadlen Glasgoch wedi'i restru yn Adran 8 o Ddeddf Bywyd Gwylt a Chefn Gwlad 1981.

Peryglon

Rhestrir y peryglon i'r rhywogaeth isod:

- **Darfyddiad neu newidiadau mewn rheolaeth o laswelltir:** Ym Maenorbŷr, mae Gorfanhadlen Lasgoch wedi ei gyfyngu ar y cyfan i un safle o laswelltir twyn sefydlog sydd (yn y gorffennol) wedi'i bori gan ferlod, gwartheg, a chwningod. Roedd y dwysedd pori yn hanfodol wrth gynnal lawntiau byr, agored, lle gallai'r rhywogaeth letyol (Milddail) ffynnu. Gallai'r lawntiau byr hefyd fod wedi peri i'r pridd gynhesu, gan hybu eginiad a datblygiad y planhigyn, sydd â'i fwyafrif dan yr wyneb. Pan ddarfyddid pori, ac yn absenoldeb torri cyson, datblygodd glaswelltir dwys ar y safle nad oedd yn ffafriol i'r rhywogaeth letyol. Adferwyd torri blynyddol ar y safle ddiwedd haf yn 1998, gan wella cyflwr y glaswelltir bron yn unionsyth. Ond mae'r Ddraenen Ddu a rhedyn yn parhau i beryglu'r rhywogaeth, ac efallai bydd angen dechrau ychwanegu pori ysgafn dros yr hydref a'r gaeaf yn ogystal â'r torri (gan ferlod neu eifr er enghraifft). Byddai pori merlod yn help i greu a chynnal ardaloedd agored o dir moel, allai helpu sicrhau fod yr hedyn yn gallu cysylltu â'r rhywogaeth letyol.
- **Newidiadau yn lefelau mwynau'r pridd:** Mae Gorfanhadlen Lasgoch yn tueddu i ffafrio tir tywodlyd alcali, sy'n draenio'n gyflym a chyda lefelau mwynau isel. Byddai cynyddu lefelau mwynau yn uniongyrchol ar y safle, neu o ffynonellau allanol megis treigl gwrtaith, yn hybu tyfiant gwellt bras tal cystadleuol, megis Troed-y-ceiliog, ar draul y rhywogaeth letyol. Gan nad yw pori'n ymarferol yn Ninbych-y-pysgod, dylid cario unrhyw ddeunydd planhigol sydd wedi'i dorri o'r safle.
- **Aflonyddu ffisegol difrifol:** Gall aflonyddu ffisegol difrifol (megis sathru ac erydiad o ganlyniad i gynnydd mewn gweithgareddau hamdden ar y safle) arwain at ddirywiad y cynefin, a niwed i'r pigynau blodeuog. Mae yna dystiolaeth sy'n awgrymu y gall Gorfanhadlen Lasgoch fuddio o ychydig o aflonyddu tir wedi'i reoli, and mae lefelau uwch yn arwain at ddirywiad ym mhoblogaeth y rhywogaeth letyol,

newidiadau mawr yn strwythur y pridd, a newid yn y micro-amgylchedd a allai fod yn fygythiad mawr i'r rhywogaeth.

- **Defnydd o chwynladdwyr:** Mae chwynladdwyr yn cael eu defnyddio ar ymylon y safle yn Ninbych-y-pysgod a gallai beri niwed i'r boblogaeth.
- **Darnio Cynefinoedd Addas:** Mae'n bosibl mai gweddillion meta-boblogaeth yw'r safle ym Maenorbŷr- a gallai'r ddau gyn-safle fod wedi bod â chysylltiadau agos â Maenorbŷr. Dylid ystyried adfer unrhyw gynefinoedd addas ar y ddau gyn-safle, ac ailgyflwyno'r rhywogaeth yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Ystafbwl. Dylid cysidro hefyd casglu hadau mewn blynyddoedd llwyddiannus er mwyn hwyluso gwasgariad ac ailgyflwyno.
- **Hinsawdd (hirdymor) a thywydd (tymor byr):** Mae teulu Gorfanhadlen ar y cyfan yn ffafrio safleoedd cynnes, sydd yn draenio'n gyflym. Gall yr hafau cynhesach a sychach a ddaw o sgil cynhesu byd eang fod o fudd i'r rhywogaeth, tra gall cyfres o hafau gwlyb ac oer gael effaith niweidiol yn y tymor byr. Gall effaith y tywydd a'r hinsawdd fod yn sylweddol, o gysidro nad oes gan y rhywogaeth lawer o boblogaethau hyd arfordir deheuol a dwyreiniol Lloegr. Efallai bod modd lleihau effaith hafau oer a gwlyb trwy sicrhau bod ystod y rhywogaeth yn cael ei adfer (os yn bosibl) a bod cyflwr y cynefinoedd yn cael ei wella o fewn ei ystod bresennol.
- **Argaeledd y rhywogaeth letyol:** Mae argaeledd y rhywogaeth letyol, Milddail, yn bwysig iawn i oroesiad Gorfanhadlen Lasgoch. Tybir fod poblogaeth Milddail wedi dirywio yn safle Maenorbŷr, ac efallai ei fod wedi'i golli neu ei leihau yn y safleoedd hanesyddol. Mae Milddail yn gallu adfywio o ddarnau o rhisom, ac mae hadau sy'n glanio ar dir moel yn egino'n gyflym. Yn Seland Newydd mae Milddail yn cael ei gysidro'n rhywogaeth sy'n gallu dioddef cyfnodau sych, ac yn dipyn o boendod i ffermwyr grawn gan ei fod yn ymledu tir aredig yn gyflym iawn. Wrth i'r lawntiau glaswellt yn y safleoedd Gorfanhadlen Lasgoch sefydlogi a chael eu cau, mae'r safleoedd egino yn diflannu ac mae'r tir yn gwlychu ac yn dod yn llai addas. Mae diffyg aflonyddu ar y tir hefyd yn lleihau'r cyfleodd i rhisomau ddarnio a gwasgaru.

Cynlluniau a Pholisiau Perthnasol a Ffynonellau Gwybodaeth Bellach

Dyma'r cynlluniau/polisiau sy'n effeithio'n uniongyrchol ar reolaeth y rhywogaethau hyn yn Sir Benfro:

- Cynllun Gweithredu Cynefinoedd Arfordirol. I'w gael yma: <http://ukbars.defra.gov.uk/project/show/36391>
- Cynllun Gweithredu Cynefinoedd Glaswelltiroedd. I'w gael yma: <http://ukbars.defra.gov.uk/project/show/36385>

- Datganiad Rheolaeth SSSI Freshwater East i Skrinkle Haven. I'w gael yma: <http://www.ccg.gov.uk/landscape--wildlife/protecting-our-landscape/special-landscapes--sites/protected-landscape/sssi/sssi-sites/freshwater-east-cliffs.aspx>
- Prais, B. (2010) *Orobanche purpurea* on its newly discovered site near Zaton Dolna (NW Poland): the problem of protection of a threatened parasitic plant species. Biodiv. Res. Conserv. 17; 33-38.

Amcanion y Cynllun

Amcan	Terfyn	Sylwadau
Atal unrhyw leihad yng ngwasgariad y rhywogaeth yn Ninbych-y-pysgod a Maenorbŷr.	Yn parhau	
Sicrhau bod pigau blodeuog yn ymddangos ar y safleoedd hysbys o leiaf dair blwyddyn ym mhob chwech.	Yn parhau	
Dylai'r rhywogaeth letyol, Milddail, gael ei wasgaru trwy'r safleoedd hysbys gan orchuddio 10%, a chyda amledd o 80%.	Yn parhau	

Gweithredoedd a Awgrymir

Gweithred	Adroddiad gan	Prif rôl	Cynnydd / Gwybodaeth Ychwanegol
Monitro: Arolwg blynyddol o bigau blodeuog.		BSBI	
Rheolaeth safle, er mwyn hybu cynnydd yn y rhywogaeth letyol ac i wella safon cynefinoedd glaswellt ar y prif safleoedd yn Ninbych-y-pysgod a Maenorbŷr.			Gwaith cynyddu poblogaeth Milddail ar safleoedd allweddol (jail-blannu, ysgriffio, etc.)
Gwarchod safleoedd: i'w gyflawni trwy ymgynghoriadau statudol gyda CNC, trwy fecanwaith y SSSI ym Maenorbŷr, a'n uniongyrchol â Chyngor Sir Benfro sy'n berchen a'n rheoli'r safle yn Ninbych-y-pysgod.			
Rheoli mynediad ar gyfer gweithgareddau hamdden, gan leihau effaith aflonyddiadau (e.e. sathru gormodol).			
Cyflawni treialon er mwyn cynyddu poblogaethau Milddail, efallai ar safleoedd heb Gorfanhadlen Lasgoch (i osgoi			

Adolygwyd Ebrill 2015

niweidio); aredig graddfa fechan, ogedu, neu gloddio,			
Canfuwyd pigyn blodeuog marw ar laswelltir gweryll ym Maenorbŷr yn 2014. Yn tyfu mewn ardal a chyfoeth o Filddail, ond nid oedd modd gwneud adnabyddiad pendant. Angen arolwg y safle yn haf 2015.			
Cysidro adfer cynefinoedd ac ail-gyflwyno mewn safleoedd allai wella cysylltedd er mwyn ail-sefydlu'r boblogaeth hanesyddol (os yn briodol).			
Cysidro aredig bas gyda phalwr neu offer arall ar safle Maenorbŷr.			
Clirio draenen ddu yn achlysurol a phrysgwydd eraill yn Ninbych-y-pysgod, ble mae'r allt laswellt dan fygythiad prysgwydd.			